



Durante la campaña de muestreo de detección precoz de larvas de este 2013

La Confederación del Ebro detecta mejillón cebra adulto en el embalse de La Sotonera (Huesca)

- Aunque pasa a clasificarse oficialmente como embalse “afectado”, no se producirán variaciones en sus condiciones de navegación durante este verano ya que la Confederación construyó una estación de desinfección de embarcaciones que gestionará de forma provisional el club náutico de la zona
- El Organismo, que participa de forma activa en actividades de control, normativas, divulgativas y de investigación, ha promovido la puesta en funcionamiento de estaciones de desinfección como medida eficaz para evitar la propagación de las especies invasoras

05, ago. 2013- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha confirmado oficialmente por fuentes propias, a través de la detección de adultos, la presencia de mejillón cebra en el embalse de La Sotonera (Huesca). La detección se ha realizado a través de los testigos de control colocados en el embalse. Como consecuencia, el embalse pasa a clasificarse como embalse “afectado”, tipo C.

A pesar de ello, durante este verano no se verán afectadas las actividades náuticas y no se procederá a la suspensión de la navegación. Esto se debe a que la Confederación Hidrográfica construyó de forma preventiva una estación de desinfección de embarcaciones en este embalse y aunque su gestión debe entregarse a otra administración que se haga cargo, algo que no ha sucedido en este caso, los meses que restan de campaña de verano la aceptará, de forma provisional, el Club Náutico La Sotonera, para que no se vea afectada la actividad turística de la zona.

Eso sí, en los embalses clasificados como tipo C los usuarios no pueden navegar en otros embalses de la Cuenca, como así se establece en los protocolos a tal efecto. En La Sotonera, esta medida entra hoy mismo en vigor.



El próximo año, para no proceder a la prohibición total de la navegación y la denegación de declaraciones responsables de navegación, deberá plantearse de nuevo la entrega a alguna de las administraciones interesadas en fomentar la navegación en la zona, ya sea Ayuntamientos, Comarcas, etc, como ocurre en el resto de embalses con afección de mejillón cebra.

El Organismo insiste en la necesidad de cumplir con los protocolos de desinfección de embarcaciones que pueden retrasar e incluso evitar el contagio de nuevas masas de agua. Todos los usuarios deben desinfectar sus embarcaciones y equipos al entrar y salir de la masa de agua, para evitar la entrada de nuevas especies exóticas y la propagación de mejillón cebra a otras masas de agua. La información sobre estos protocolos y sobre la navegación en las distintas masas de agua se puede consultar en la web de la Confederación www.chebro.es.

La Confederación continúa, además, con la campaña de detección precoz de mejillón cebra en estado larvario, que se realiza todos los años, entre el mes de mayo y octubre en los principales embalses de la Cuenca.

Actualmente, los embalses con presencia de adultos de mejillón cebra son Mequinenza, Ribarroja, Flix, Sobrón, Calanda, Caspe II o Cíván y Urrúnaga. También siguen clasificados como Tipo C, porque en alguna campaña anterior se ha detectado presencia de larvas, Talarn, Rialb, San Lorenzo de Montgay, Lanuza, Búbal, Ullíbarri, La Tranquera y La Estanca. A todos estos se añade La Sotonera con la detección de larvas y ejemplares adultos.